



Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente

EUZOFERA O ABICHADO DEL OLIVO

La euzofera o abichado es una mariposa cuyas orugas de color blanco grisáceo viven debajo de la corteza del árbol (**Fotografía nº 1**), haciendo galerías dificultando la circulación de la savia. Otras veces se encuentran larvas de euzofera en verrugas de tuberculosis aunque aquí los daños que produce son muy limitados (**Fotografía nº 2**). El olivo afectado crece menos, pierde vigor, adquiere un color verde pardusco (**Fotografía nº 3**) y cuando las orugas cortan le flujo de savia el olivo muere (**Fotografía nº 4**). En cualquier caso el olivo muestra un decaimiento lento y en muchas ocasiones rebrota por debajo de la madera afectada.



Fotografía nº 1. Orugas de Euzofera bajo la corteza del árbol




Fotografía nº 2. Verruga habitada por euzofera



Fotografía nº 2. Aspecto olivo atacado por Euzofera

Los daños más graves de esta plaga se producen en olivar joven, las mariposas aprovechan para poner los huevos en pequeñas heridas, cortes de poda, roze de los arados, verrugas de tuberculosis (**Fotografía nº 2**), grietas producidas por hielo, etc. La presencia de esta plaga se aprecia por las deyecciones de la oruga mezcladas con serrín y sedas que hay alrededor de las heridas. Es importante saber que en olivos que hayan sufrido mucho frío en invierno, los daños de euzofera serán muy graves en verano.



Fotografía nº 3. *Olivo gravemente atacado por Euzofera*

El **tratamiento** es difícil por lo inaccesible que están las larvas, lo recomendable es tratar en *mayo y septiembre*, que es cuando más concentradas están las puestas con un aceite mineral de verano más un insecticida autorizados en cada uno de los tipos de cultivo sea *convencional o ecológico*. Es necesario mojar bien las zonas donde es previsible que se produzcan los daños (*heridas en general*) con brocha o con boquillas a baja presión para que el producto penetre bien.